



COVID-19-IMPfung

Checkliste Impfstoff mit mRNA-Impfstoffen**✓ spezifisch vor 1. Impfung****Administrative Klärung**

- Abklären, wie die zu impfende Person krankenversichert ist (OKP/Versichertenkarte)
- Die Identität der zu impfenden Person verifizieren

Abklärung Impfindikation

- **Impfung für alle erwachsene Personen indiziert (für Comirnaty® ab 16 für Moderna ab 18 Jahren)**
- **Basierend auf der aktuellen Impfeempfehlung der EKIF/BAG**
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen

Abklärung Kontraindikationen

- Bekannte Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe des Impfstoffes (insbesondere Polyethylenglykol [PEG] resp. Makrogol)

Impfung aktuell nicht empfohlen

1. **Vorerst noch nicht generell für schwangere Frauen empfohlen aber möglich (Impfung nach Nutzen-Risiko-Abwägung siehe unten bei besondere Vorsichtsmassnahmen)**
2. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (für Comirnaty® unter 16 Jahren)

**Abklärung besonderer
Vorsichtsmassnahmen**

1. Generell bekannte Überempfindlichkeitsreaktionen/Allergien?
2. Immunsuppression (angeboren, erworben, immunsuppressive Therapie einschliesslich Krebserkrankung unter Behandlung)
→ Impfindikation grosszügig nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch Facharzt resp. Fachärztin und nach entsprechender Aufklärung
3. **Schwangere Frauen (ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel)** → Indikationsstellung nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung und nach entsprechender ärztlicher Aufklärung sowie schriftlicher Einwilligung und Dokumentation
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen

✓ spezifisch vor 2. Impfung**Unerwünschte Impferscheinungen
(UIE) nach erster Impfung?**

- Dokumentation im IT-Tool erfassen
- Unerwartete oder schwerwiegende UIE müssen von der medizinischen Fachperson, welche die UIE feststellt, an Swissmedic gemeldet werden
- Bei einer anaphylaktischen Reaktion nach der 1. Impfdosis sollte keine 2. Impfdosis gegeben werden. Siehe auch die Erläuterung in der Impfeempfehlung:
www.bag.admin.ch/covid-19-dokumente-gesundheitsfachpersonen
- Das Auftreten eines "Covid-Arms" nach der ersten Impfung ist keine Kontraindikation für die Gabe der 2. Impfdosis

Meldung UIE Swissmedic

- Über Link zum Meldesystem «ELViS» im IT-Tool
www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/elvis.html



✓ Durchführung 1. Impfung/2. Impfung

Aktueller Gesundheitszustand/ Covid-19 Anamnese	<ul style="list-style-type: none"> • Generellen Gesundheitszustand abklären und entscheiden: Kann die Impfung heute erfolgen? • Akute fieberhafte Erkrankung? Impfung verschieben, bis die Symptome abgeklungen sind • Status nach bestätigter SARS-CoV-2 Infektion (PCR-/Antigentest/IgG Antikörper) (Selbsttests gelten nicht als Nachweis für eine durchgemachte Infektion) Impfung mit nur einer Impfdosis genügt falls mindestens 4 Wochen nach Infektion. Impfung empfohlen ab sechs Monate nach Infektion (baldmöglichst). (bei besonders gefährdeten Personen ab drei Monaten). Impfung schon nach Abklingen der Symptome möglich (mit 2 Dosen falls weniger als 4 Wochen nach Infektion). Ausnahme: bestätigte SARS-CoV-2 Infektion bei immundefizienten Personen: 2 Impfdosen nach 3 Monaten • Bei SARS-CoV-2 Infektion nach der 1. Impfung: Vorgehen wie bei ungeimpften Personen nach bestätigter SARS-CoV-2 Infektion
Aufklärung Klientin/Klient	<ul style="list-style-type: none"> • Hat die zu impfende Person Fragen? • Hat sie das Informationsmaterial gelesen? • Auf mögliche UIE hinweisen, insbesondere auf mögliche allergische Reaktionen
Einwilligung Klientin/Klient	<ul style="list-style-type: none"> • Mündliche Einwilligung der zu impfenden Person zur Impfung auf Basis einer informierten Entscheidung sowie zur elektronischen Erfassung der Impfung im Datenerfassungssystem einholen • Für die Impfung einer schwangeren Frau muss eine schriftliche Einwilligung vorliegen • Schriftlichen Vermerk zur Einwilligung zur Impfung im Impfdatenblatt/IT-Tool machen • Im Falle von Urteilsunfähigkeit muss die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung vorliegen
Ausfüllen Impfdatenblatt/ Erfassung im IT-Tool	<ul style="list-style-type: none"> • Eintragen der relevanten Daten der zu impfenden Person im IT-Tool
Aufbereitung Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Merkblatt Hersteller: www.bbraun.ch/kit-covid19/ / www.comirnatyeducation.ch/ / www.modernacovid19global.com • Mögliche Vorgehensweisen zur Entnahme von 6 Dosen Comirnaty® • Nicht schütteln, nur mehrmals umdrehen, nicht unnötig bewegen • Der Stopfen sollte mit der Aufziehnadel möglichst nur einmal durchstoßen und die Bewegung der Kanüle minimiert werden.
Applikation Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Merkblatt Hersteller: www.bbraun.ch/kit-covid19/ / www.comirnatyeducation.ch/ / www.modernacovid19global.com • i. m. M. deltoideus • Beide Impfdosen mit gleichem Impfstoff, Abstand 28 Tage (Comirnaty®: mindestens 21 Tage) • Bei antikoagulierten Patienten und Patientinnen: Die Impfung erfolgt ebenfalls i. m., wichtig ist eine gute anschliessende Kompression (www.bag.admin.ch/impfplan)

✓ Nach 1. Impfung/2. Impfung

Aufklärung Verhalten bei UIE	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf hinweisen, dass schwerwiegende oder unerwartete UIE gemeldet werden sollen und Klientin resp. Klient sich bei Ärztin/Arzt/Apothekerin/ Apotheker/Impfstelle melden soll • Ggfs. Kontaktnummer mitgeben
Aufklärung Verhalten generell nach 1./2. Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterhin Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten. Ausnahme sind private Treffen zwischen vollständig geimpften Personen (Verzicht auf Maske und Abstand möglich). • Falls nach 2. Impfung eine Boosterimpfung nötig wird, wird informiert • Bei Auftreten von Covid-19-kompatiblen Symptomen Test durchführen (Impfung nicht 100% wirksam) • Isolations- und Quarantäneregeln bis auf weiteres wie bisher einhalten Ausnahme: Bei vollständig geimpften Personen kann nach der letzten Dosis für einen Zeitraum von 6 Monaten auf eine Kontakt- und Reisequarantäne verzichtet werden (gemäss kantonaler Weisung und Angaben BAG Webseite: Reisen (admin.ch)). • Andere Impfungen sollen mit einem Abstand von mindestens 1 Woche verabreicht werden
Abgabe Impfnachweis	<ul style="list-style-type: none"> • Impfnachweis aus IT-Tool mitgeben bzw. Eintrag im Impfausweis machen • Falls möglich Stempel und Unterschrift der impfenden Person • LOT-Nummer in Impfnachweis einkleben/eintragen
Aufbieten 2. Termin (falls nötig)	<ul style="list-style-type: none"> • Termin am gleichen Impfort mit gleichem Impfstoff, im IT-Tool vermerken • Ggfs. Terminkärtli mitgeben • Merkblatt mit Angaben zum Verhalten nach der Impfung mitgeben
Beobachtungszeit nach 1./2. Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • Für den Fall einer allergischen Reaktion muss geschultes Gesundheitspersonal und eine Notfallausrüstung inklusive Adrenalin zur Verfügung stehen • Insbesondere Personen überwachen, die bereits direkt nach der Impfung Probleme hatten, z. B. Kreislaufprobleme • Alle geimpften Personen sollen mindestens 15 Minuten nach der Impfung am Impfort verweilen. Wenn die 1. Dosis gut toleriert wurde, ist eine Überwachung von 5 Minuten nach der 2. Dosis ausreichend.